

A fedezet kiterjesztése a minőségi jégkárokra

1. Jelen záradék alapján, pótdíj fizetése ellenében a fedezet kiterjed a biztosítási szerződésben megjelölt biztosított vagyontárgyakban az alábbiakban meghatározott kockázatviselési időszak alatt bekövetkező minőségi jégkárokra.

1.1 A minőségi jégkárok esetén a kockázatviselési időszak kezdete:

- szamócában, valamint zöldborsóban vetéstől, ültetéstől, telepítéstől;
- szántóföldi kertészeti kultúrákban a terméskezdemények megjelenésétől;
- almás termésű és csonthéjas gyümölcsűekben a tisztuló hullás befejeződésétől;
- bogyós gyümölcsűekben, szamócában a terméskezdemény megjelenésétől;
- szőlőben, a fürtök megjelenésétől;
- egyéb növények esetében külön megállapodás szerint.

1.2 A minőségi jégkárok esetén a kockázatviselési időszak vége:

- szántóföldi kertészeti kultúrákban a termés betakarításáig;
- gyümölcsökben, szőlőben, az érést szabályozó vagy a betakarítást megkönnyítő vegyszeres kezelés időpontjáig. Annak hiányában a termés gazdaságilag érett állapotáig;
- egyéb növények esetében külön megállapodás szerint.

2. A minőségi jégkárok esetén a kár megállapítása a következők figyelembevételével történik:

- a károsodott terület nagysága,
- a növények biztosítási esemény nélküli várható hozama (maximum a biztosított hozam),

- a záradék szerint meghatározott módon becsült kár százaléka a károsodott területen,
- az adatszolgáltatáskor rögzített egységár.

$$\text{Kár (Ft)} = \text{károsodott terület (ha)} \times (\text{hozam (t/ha)} \times \text{kár százaléka}) \times \text{egységár (Ft/t)}.$$

A biztosítási szerződésben szereplő abszolút és/vagy levonásos önrész kerül alkalmazásra.

3. Értékcsökkenési kulcsok a minőségi károk megállapításához:

Alma, téli körte osztályozása

3.1. Épnek minősülnek — tekintet nélkül a nagyságra — azok az almák és téli körték, amelyek: jégveréstől nem sérültek, valamint azok, amelyeken a jégütések, kiforrások együttes átmérője 5 mm-nél nem nagyobb.

3.2. I. osztályba tartoznak azok az almák és téli körték, amelyeken több kisebb felszínes jégverésnyom - kiforrás, illetve vakütés - található.

A vakütés helyén a gyümölcs héja behorpadt, alatta a gyümölcs húsa megbarnult, folytonossági hiány, kavernás sérülés nincs, a jégütések átmérőjének együttes összege 10 mm-nél nem nagyobb.

Értékcsökkenés: 10%

3.3. II. osztályba tartoznak azok az almák és téli körték, amelyeken több felszíni jégverésnyom - kiforrás, vakütés -, valamint tökéletesen elparásodott sebzés található, a sérülések, felszíni és beparásodott sebzések átmérőjének együttes összege 20 mm-nél nem nagyobb.

Értékcsökkenés: 30%

3.4. III. osztályba tartoznak azok az almák és téli körték, amelyeken a felszíni jégverésnyomok, vakütések, a kavernás jégütések, a kisebb deformálódások együttesen a gyümölcs felületének egynegyedét nem haladják meg és étkezési célokra még alkalmasak.

Értékcsökkenés: 50%

3.5. Alárendelt osztályba tartoznak azok az almák és körték, amelyeken több nyílt kavernás vagy beparásodott, nagyobb jégütés található, ill. amely gyümölcs a felületének egynegyedénél nagyobb mértékben alaktalanná vált, de ipari felhasználásra még alkalmas.

Értékcsökkenés: 75%

3.6. Elenyészett az az alma és téli körte, amelyet a jég leverte vagy a jégverés következtében még ipari célokra sem alkalmas.

Értékcsökkenés: 100%

Cseresznye, meggy, nyári körte, őszi-, kajszibarack, szilva, szamóca és szőlő osztályozása

3.7. Ép: minden jégveréstől mentes gyümölcs.

3.8. Gyengén sérült: a gyümölcsökön kisebb felszíni vakütések vannak

Értékcsökkenés: 20%

3.9. Sérült: nagyobb felszíni sérüléssel gyümölcs, ami emberi táplálkozásra még alkalmas.

Értékcsökkenés: 40%

3.10. Alárendelt: az ipari feldolgozásra még alkalmas gyümölcs.

Értékcsökkenés: 75%

3.11. Elenyészett: a levert, rothadásnak indult gyümölcs, mely ipari feldolgozásra sem alkalmas.

Értékcsökkenés: 100%

Paprika, dinnye, uborka és spárgatök osztályozása

3.12. Felületi ütés, sebzés nélkül, nagyobb foltosodás.

Értékcsökkenés: 10%

3.13. Kisebb mérvű nyílt sebzés, kisebb deformálódás.

Értékcsökkenés: 40%

3.14. Nagyobb mérvű nyílt sebzés, nagyobb mérvű parásodás, vagy deformálódás.

Értékcsökkenés: 75%

3.15. Gyümölcsleverés, vagy teljes roncsolás, illetve romlást okozó sebzés.

Értékcsökkenés: 100%

Zöldborsó és zöldbab osztályozása

3.16. Zöldborsó esetén

- Épnek kell tekinteni azokat a borsóhévelyeket, melyekben a borsószemek a jégveréstől nem károsodtak,
- Sérültnek minősíthetők a borsóhévelyek abban az esetben, ha bennük a borsószemek károsodtak. A sérülés mértéke, az értékcsökkenési százalék, változó lehet attól függően, hogy a borsóhévelyeken belül milyen az ép és a romlott, sérült szemek aránya.
- Elpusztultnak tekinthetők mindazon borsóhévelyek, melyekben a jégverés következtében valamennyi borsószem tönkrement.

Értékcsökkenés: 100%

3.17. Zöldbab esetén

- Épnek kell tekinteni a jégveréstől mentes zöldbabbhévelyeket,
- II. osztályúnak minősíthetők azok a zöldbabbhévelyek, melyeken sebzés nélküli felületi jégütések láthatók.

Értékcsökkenés: 10%

- III. osztályúnak minősíthetők azok a zöldbabbüvelők, amelyeken a kisebb sebzések beparásodtak.

Értékcsökkenés: 40%

- Alárendeltnek kell tekinteni a zöldbabbüvelőket abban az esetben, ha felületükön roncsolt, nyílt sebzések láthatók,

Értékcsökkenés: 75%

- Elenyészett az a zöldbabbüvelő, mely törött, valamint elpusztult.

Értékcsökkenés: 100%

Dohány osztályozása

A károsodás mértékének megállapítása a dohánylevelek sérülése alapján történik. A mintaterekről letört leveleket az alább megadott lemezhiány határok alapján osztályozzuk.

- Ép a levél (5% lemezhiányig)
- II. osztályú a levél (6-20% lemezhiányig)

Értékcsökkenés: 20%

- III. osztályú a levél (21-40% lemezhiányig)

Értékcsökkenés: 40%

- Alárendelt a levél (40%-on felüli lemezhiányig, vagy bordatörött, de feldolgozásra még alkalmas)

Értékcsökkenés: 75%

- Elenyészett a levél (feldolgozásra már nem alkalmas)

Értékcsökkenés: 100%

4. Egyebekben az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.

Allianz Hungária Zrt.